Régression de la Chouette chevêche, *Athene noctua* SCOP., en bordure des Vosges du Nord.

Référence BOF : 09226
Auteur(s) : GÉNOT J.C.
Date : 1990
Titre : Régression de la Chouette chevêche, *Athene noctua* SCOP., en bordure des Vosges du Nord.
Périodique : *Ciconia*
Volume/pagination : 14 : 65-83.

Espèces mentionnées

- Perdrix grise (*Perdix perdix*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- Effraie des clochers (*Tyto alba*)
- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

Lieux d'observations

- Moselle
- Bas-Rhin

Thème

- Dénombrements d’oiseaux nicheurs - densités
- Fluctuations d’abondance - régression - extension
- Répartition en France ou sur une partie du pays

Résumé

La population nicheuse de Chouette chevêche de la bordure des Vosges du Nord est recensée de 1984 à 1989 par la recherche des mâles chanteurs au printemps, d'indices de présence et de cavités tout au long de l'année. 19 sites sont occupés sur une superficie prospectée de 437 km2; ils sont regroupés en trois secteurs. La répartition est très inégale avec de vastes zones inoccupées malgré la présence de biotopes favorables et des regroupements où les concentrations maximales ne dépassent pas 3 mâles chanteurs pour 1 km2. En quatre années, l'Alsace Bossue perd près de 60 % de ses effectifs.