Anatidés et zones humides de France métropolitaine.

Référence BOF : 12373
Auteur(s) : YÉSOU P., TROLLIET B., SOUTH M.
Date : 1983
Titre : Anatidés et zones humides de France métropolitaine.
Périodique : *Bull. mens. Off. Nat. Chasse*
Volume/pagination : N. Scient. et techn. : 315 p.

Espèces mentionnées

- Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)
- Cygne de Bewick (*Cygnus columbianus*)
- Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*)
- Oie des moissons (*Anser fabalis*)
- Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*)
- Oie rieuse (*Anser albifrons*)
- Oie naine (*Anser erythropus*)
- Oie cendrée (*Anser anser*)
- Oie des neiges (*Anser caerulescens*)
- Bernache du Canada (*Branta canadensis*)
- Bernache nonnette (*Branta leucopsis*)
- Bernache cravant (*Branta bernicla*)
- Bernache à cou roux (*Branta ruficollis*)
- Ouette d'Egypte (*Alopochen aegyptiacus*)
- Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
- Canard mandarin (*Aix galericulata*)
- Canard siffleur (*Anas penelope*)
- Canard à front blanc (*Anas americana*)
- Canard chipeau (*Anas strepera*)
- Sarcelle élégante (*Anas formosa*)
- Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
- Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)
- Canard noir (*Anas rubripes*)
- Canard pilet (*Anas acuta*)
- Sarcelle d''été (*Anas querquedula*)
- Sarcelle à ailes bleues (*Anas discors*)
- Canard souchet (*Anas clypeata*)
- Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*)
- Nette rousse (*Netta rufina*)
- Fuligule milouin (*Aythya ferina*)
- Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*)
- Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
- Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)
- Fuligule milouinan (*Aythya marila*)
- Eider à duvet (*Somateria mollissima*)
- Eider à tête grise (*Somateria spectabilis*)
- Eider de Steller (*Polysticta stelleri*)
- Harelde boréale (*Clangula hyemalis*)
- Macreuse noire (*Melanitta nigra*)
- Macreuse à front blanc (*Melanitta perspicillata*)
- Macreuse brune (*Melanitta fusca*)
- Garrot d'Islande (*Bucephala islandica*)
- Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)
- Harle piette (*Mergus albellus*)
- Harle huppé (*Mergus serrator*)
- Harle bièvre (*Mergus merganser*)

- Érismature rousse (*Oxyura jamaicensis*)
- Érismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*)
- Dendrocygne fauve (*Dendrocygna bicolor*)
- Oie à tête barrée (*Anser indicus*)

Lieux d'observations

- Aube
- Etang du Der (Champaubert) ou Réservoir Marne (en Marne et Haute-Marne)
- Somme
- Parc du Marquenterre et baie de Somme (dans la Somme)
- Eure
- Seine-Maritime
- Brenne (dans l'Indre)
- Sologne (dans le Loiret, le Loir-et-Cher et le Cher)
- Calvados
- Manche
- Baie du Mont-St-Michel (dans la Manche)
- Nièvre
- Saône-et-Loire
- Nord
- Pas-de-Calais
- LORRAINE
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Moselle
- Cours français du Rhin (dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin)
- Loire-Atlantique
- Lac de Grand-Lieu (dans la Loire-Atlantique)
- Maine-et-Loire
- Vendée
- Île de Noirmoutier (en Vendée)
- Côtes d'Armor
- Finistère
- Ille-et-Vilaine
- Morbihan
- Charente-Maritime
- Ile d'Oléron (en Charente-Maritime)
- Gironde
- Bassin d'Arcachon, banc d'Arguin et réserve du Teich (dans la Gironde)
- Landes
- Pyrénées-Atlantiques
- Dombes (dans l'Ain)
- Loire
- Lac Léman (partie française en Haute-Savoie)
- Allier
- Puy-de-Dôme
- Aude
- Gard
- Hérault
- Pyrénées-Orientales
- Alpes-Maritimes
- Bouches-du-Rhône
- Camargue (dans les Bouches-du-Rhône)
- Var
- Corse-du-Sud et Haute-Corse

Thème

- Alimentation (Régime et zones) – Dépenses énergétiques
- Chasse (impact, tableaux) – gestion des populations
- Dénombrements d’oiseaux hivernants - hivernage
- Dénombrements d’oiseaux nicheurs - densités
- Fluctuations d’abondance - régression - extension
- Habitat - biotope
- Influence de l’action humaine
- Influence des conditions météorologiques
- Migration (dates de départ, d'arrivée, routes suivies...) - déplacements

Référence extraite de la Bibliographie Ornithologique Française
PDF généré le 29/03/2024 depuis le site www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr